



Cosa c'è dietro un normalissimo test di gravidanza? La tanto attesa striscetta rosa o blu in base al test, sta ad indicare la presenza o meno delle Beta HCG, ossia la gonadotropina corionica che è una glicoproteina prodotta esclusivamente dalla placenta. A cosa serve? L'HCG viene secreto nell'apparato riproduttivo femminile a partire dal 7° giorno del concepimento. Ed è proprio questo valore che ci farà scoprire se siamo incinta e anche, in base al valore, di quante settimane.

La sua produzione aumenta fino alla fine del terzo mese di gestazione, per poi ridiscendere e mantenersi stabile fino al parto. Questo test permette di effettuare la diagnosi di gravidanza pochi giorni dopo la mancata mestruazione (5-7 gg.) e viene anche utilizzato per individuare con urgenza le gravidanze extrauterine in fase iniziale. Inoltre, il suo monitoraggio durante i primi 3 mesi di gestazione permette di valutare il corretto andamento della gravidanza ed eventuali minacce di aborto. Un tasso di HCG inferiore a 10 UI/l esclude una gravidanza, un tasso superiore la indica con certezza.

Ricordati che tendenzialmente le beta:

- raddoppiano ogni 2 giorni per valori fino a 1200 UI
- raddoppiano ogni 3 giorni per valori da 1200 UI a 6000 UI
- raddoppiano ogni 4 giorni per valori superiori a 6000 UI.

Andamento di gravidanza:

- 3° mese (9+3 - 13+5 settimane)
- 4° mese (13+6 - 18+1 settimane)
- 5° mese (18+2 - 22+3 settimane)
- 6° mese (22+4 - 26+6 settimane)
- 7° mese (27 - 31+3 settimane)
- 8° mese (31+4 - 35+3 settimane)

Scritto da Eva Forte
Lunedì 10 Giugno 2019 10:57

9° mese (35+4 - 40 settimane)

Settimana	Valore minimo	Valore massimo
1	12.8	77.5
2	45	1175
3	330	10200
4	2160	82640
5	6225	181075
6	15600	184000
7	15125	199500
8	24400	221400
9	22075	22700
10	21500	188925
11	18525	182550
12	24650	175775
13	23425	181750
14	21160	175305
15	11475	124350
16-27	4150	79350
28-38	2535	68750

In caso di aborto spontaneo o provocato: Le beta cominciano a scendere gradualmente e dipende da donna a donna oltre che dal valore che avevano nel momento dell'interruzione. Il periodo in cui si azzerano del tutto può quindi variare (anche svariate settimane) ma è sempre meglio monitorare la discesa. Se le beta si fermano o continuano a salire è indispensabile sentire immediatamente il proprio ginecologo.