

Scritto da Maria Ida Longo  
Mercoledì 14 Aprile 2010 17:35

---



Le ragazze che bevono **alcolici** in giovane età hanno un maggior rischio di sviluppare **lesioni benigne al seno**

cinque volte maggiore rispetto a quelle che non bevono.

Questo è il risultato di uno studio della Washington University School of Medicine pubblicato sulla rivista Pediatrics.



I ricercatori hanno esaminato circa 7 mila ragazze statunitensi dai 9 ai 15 anni tra il 1996 e il 2007 e hanno scoperto che, esiste una chiara correlazione tra alcol e lesioni benigne.

Infatti le ragazze che hanno dichiarato di bere tutti i giorni avevano una probabilità maggiore di 5,5 volte più alta di quelle astemie o che bevevano solo una volta alla settimana di sviluppare una **patologia al seno** e anche un consumo più moderato, da tre a cinque volte alla settimana, aumenta il rischio di tre volte.

Secondo la ricerca vale anche la correlazione inversa, ovvero le ragazze che nel periodo di tempo considerato hanno avuto una diagnosi di lesioni benigne, bevevano molto di più delle altre.

In conclusione il Dottor Graham Colditz autore dello studio, ha spiegato che, molte ragazze iniziano a bere già in **adolescenza**, quando il tessuto del seno si sta formando rapidamente, quindi i risultati hanno confermato quello che da tempo volevano capire, l'alcol può essere un fattore di rischio anche a questa età.

**Fonte:** [AGI](#)